

APOTHEEK ONLINE



KLIK HIER



Zopiclon Online kopen

Zopiclon (imovane) 7.5 mg online bestellen zonder recept in Nederland

Imovane (7,5 mg) bevat zopiclon als werkzame stof. Deze stof behoort tot de klasse van sedatief-hypnotische middelen. Farmacologisch gezien wordt het geclassificeerd als een niet-benzodiazepine; chemisch gezien is het een cyclopyrrolon-derivaat – verbindingen die ook wel bekendstaan als 'Z-drugs'. Het is een volledig synthetische verbinding die via chemische synthese wordt geproduceerd.

Zopiclon staat in de medische praktijk bekend om zijn invloed op de slaap-waakcyclus en onderscheidt zich daarmee van conventionele sedativa. Het is een hypnoticum dat wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van slapeloosheid en is bedoeld om de inslaaptijd te verkorten. Het werkingsmechanisme is vergelijkbaar met dat van andere niet-benzodiazepinen, zoals zolpidem. De primaire functie is het moduleren van de hersenactiviteit om slaappatronen te normaliseren bij volwassenen die moeite hebben met inslapen.

Zopiclon wordt doorgaans gebruikt voor de kortdurende verlichting van symptomen van slapeloosheid bij volwassenen, met name wanneer slaapstoornissen leiden tot aanzienlijke functionele beperkingen of hinder veroorzaken bij dagelijkse activiteiten.

Symptomatische verlichting van slaapstoornissen

Imovane wordt doorgaans ingezet bij twee belangrijke categorieën symptomen van slapeloosheid: moeite met inslapen (verlengde inslaaptijd) en moeite met doorslapen (waaronder ontwaken tijdens de nacht en te vroeg ontwaken in de ochtend). Het middel wordt aanbevolen bij acute of instabiele symptomen, alsook bij ernstige episoden of wisselende klachtenbeelden. Het gebruik is geïndiceerd wanneer symptomatische ondersteuning nodig is, met name bij tijdelijke maar ernstige slaapstoornissen. De werking is ondersteunend van aard en helpt de totale ziektelast te verminderen tijdens periodes waarin slaapproblemen aanzienlijk verergeren.

Dergelijke ondersteunende therapie stelt patiënten doorgaans in staat beter met de situatie om te gaan; de inslaaptijd wordt verkort, terwijl de duur en kwaliteit van de rust toenemen. Dit helpt de functionele stabiliteit te behouden, zelfs bij aanwezigheid van symptomen die de dagelijkse routine verstoren.